




A vacina contra a febre aftosa mudou: a dose agora é de 2ml.


A partir de 2019, nas etapas de vacinação contra febre aftosa (maio e novembro), os produtores devem estar atentos à nova dosagem da vacina, que foi reduzida de 5ml para 2ml. Ela será disponibilizada em frascos de 15 ou 50 doses.

Além da alteração na dose, a nova vacina apresenta mudanças em sua composição, com a expectativa de que ocorram menos reações nos animais (caroços, inchaço) - desde que sejam adotados os devidos cuidados de manejo e higiene.

Dose anterior



Dose atual



Os bovinos e búfalos adultos ou jovens (mesmo os recém-nascidos) devem receber a mesma dose: 2ml. As vias de aplicação continuam as mesmas (intramuscular ou subcutânea), porém recomenda-se a subcutânea (entre o couro e o músculo - na tábua do pescoço) como via de aplicação preferencial a fim de minimizar as reações locais.

Vale destacar que em maio devem ser vacinados os animais com até dois anos de idade e, em novembro, os bois e búfalos de qualquer faixa etária.

Manejo e higiene

Cabe lembrar que os cuidados de higiene e manejo permanecem a fim de garantir a eficácia da vacinação e o bem-estar dos animais.

- As vacinas devem ser transportadas em recipiente isotérmico com gelo e conservadas na temperatura correta (de 2°C a 8°C) até o momento da aplicação.
- Ao iniciar e finalizar o procedimento, deve-se lavar a seringa e as agulhas e, se possível, fervê-las, guardando-as limpas e secas.
- A agulha deve ser substituída a cada dez animais vacinados.

Ao perceber qualquer suspeita da ocorrência da febre aftosa no rebanho (salivação intensa, febre, aftas na boca e/ou tetas, animal mancando), informe imediatamente ao Idaf.