

ESCRITÓRIOS DO IDAF

Afonso Cláudio	(27) 3735-1614
Alegre	(28) 3552-1478
Aracruz	(27) 3296-0101
Baixo Guandu	(27) 3732-8002
Barra de São Francisco	(27) 3756-1672
Bom Jesus do Norte	(28) 3562-2233
Cachoeiro de Itapemirim	(28) 3522-7766
Castelo	(28) 3542-2771
Colatina	(27) 3722-1881
Domingos Martins	(27) 3268-1100
Ecoporanga	(27) 3755-1319
Guaçuí	(28) 3553-1504
Guarapari	(27) 3361-3858
Ibiraçu	(27) 3257-1330
Itapemirim	(28) 3529-6058
Itarana	(27) 3720-1549
Lúna	(28) 3545-1988
Linhares	(27) 3264-2069
Mimoso do Sul	(28) 3555-1304
Montanha	(27) 3754-2196
Nova Venécia	(27) 3752-9380
Pancas	(27) 3726-1583
Pedro Canário	(27) 3764-2613
Pinheiros	(27) 3765-2863
Rio Novo do Sul	(28) 3533-1394
Santa Maria de Jetibá	(27) 3263-1849
Santa Teresa	(27) 3259-2151
São Gabriel da Palha	(27) 3727-4189
São Mateus	(27) 3763-1316
Vila Velha	(27) 3139-9663

www.idaf.es.gov.br

IDAF INSTITUTO DE DEFESA
AGROPECUÁRIA E FLORESTAL
DO ESPÍRITO SANTO

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria da Agricultura,
Abastecimento, Aquicultura e Pesca



NÃO JOGUE ESTE IMPRESSO EM VIAS PÚBLICAS.




IDAF

 RAIVA
DOS HERBÍVOROS

A raiva é uma doença letal causada por um vírus, que pode acometer todos os mamíferos, inclusive os seres humanos. Ela é transmitida por meio da arranhadura, mordedura ou lambidura de animais raivosos.

Transmissão



Sintomas

Animais de produção: geralmente apresentam raiva parálitica, começando com mudança de comportamento e evoluindo para perda de apetite, andar cambaleante, dificuldade de respirar e engolir, paralisia e morte.

Cães e gatos: geralmente apresentam a raiva furiosa, tornando-se agitados, agressivos e procurando lugares escuros. Outros sintomas são salivação intensa e apetite estranho, com ingestão de objetos que não fazem parte da alimentação.

Prevenção

A melhor forma de prevenção é a vacinação periódica dos animais.

Procedimentos

- Utilize pasta vampiricida nos animais atacados por morcegos. A pasta deve ser aplicada ao redor da ferida quando entardecer.
- Avise ao Idaf caso os animais estejam sofrendo ataques de morcegos na propriedade.
- Comunique se houver abrigo de morcegos na região (cavernas, furnas, lavras).
- Em caso de suspeita da doença, isole o animal, evite manipulá-lo e notifique o Idaf.

Vacinação

- Vacine animais de produção, cães e gatos anualmente.
- Em locais de maior ocorrência de raiva, a vacinação dos animais de produção pode ser feita duas vezes ao ano.
- Conserve a vacina na geladeira, nunca no congelador.
- Transporte a vacina em caixa de isopor com gelo.
- Mantenha a vacina resfriada até o momento da aplicação. Para isso, utilize caixa de isopor com gelo em tamanho suficiente para o frasco e para a seringa cheia.
- Leia as instruções do fabricante e siga corretamente as orientações.
- Não vacine os animais em horário de muito calor ou expostos ao sol.
- Se o animal (filhote ou adulto) nunca foi vacinado contra raiva, aplique a primeira dose e repita 30 dias depois.
- Aplique a vacina por via subcutânea ou intramuscular.
- Sempre verifique a data de validade da vacina.
- Em caso de dúvidas, procure o Idaf.

